

Calciveyxol® 38



Szarvasmarha , juh, sertés.




- Kiegészítő terápia, allergia, csalánkiütés, vérzésem diathesis, gyenge méhösszehúzódások esetén



Calciveyol® 38

Használati utasítás
és címke 500ml –es polipropilén



1.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS-GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME

Veyx Pharma GmbH , Söhreweg 6, D-34639 Swarzenborn, Németország

2.AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE
Calciveyol 38 infúzió A.U.V.

3.HATÓANYAGOK ÉSEGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

Hatóanyag:

Kalcium-glükonát 380mg/ml

Magnézium klorid hexahidrát 60mg/ml

Bórsav 50mg/ml

Vivőanyagok:

Víz parenterális célra 710mg/ml

4.JAVALLATOK

Heveny, hypocalcaemiás állapotok kezelésére. Kiegészítő terápiaként allergiák, csalánkiütés, vérzéses diathesis, gyenge méhösszehúzódások esetén.

5.ELLENJAVALLATOK

Hypercaecaeimia és hypermagnesaemia, szarvasmarhák és juhok calcinosisa, magas D3-vitamin dózisok utáni használat, krónikus veseelégtelenség, májbetegség, szervesen foszfáttal való intravénás kezelésekkel egyidejű vagy röviddel azokat követő alkalmazás. Szív és érrendszeri megbetegedésekben alkalmazása fokozott óvatosságot igényel.

6.MELLÉKHATÁSOK

A készítmény kalciumtartalma folytán a terápiás dózisban való adás esetén is kialakulhat átmeneti hypercalcaemia, ami a következőkben nyilvánul meg : kezdeti bradycardia, izgatottság, izomremegések, nyálzás, a légzésfrekvencia fokozódása. A kezdeti bradycardia, majd a szívfrekvencia növekedése a túladagolás első jeleinek tekintendők. Ilyen esetben az infúziót le kell állítani. A késői mellékhatások az általános állapot rendellenességeként, illetve az infúzió után akár 6-10 órával jelentkező hypercalcaemiás tünetekben nyilvánulhatnak meg, amit nem szabad tévesen kiújuló hypocalcaemiaként diagnosztizálni.

Ha súlyos nemkívánatos hatást vagy egyéb , az alkalmazási utasításban nem szereplő hatásokat észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost!

7.CÉLÁLLAT FAJOK

Szarvasmarha , juh, sertés.

8.ADAGOLÁS, ALKALAZÁSI MÓDOK CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Lassú intravénás alkalmazásra.

Szarvasmarha:

Heveny hypocalcaemiás állapotok:

20-30 ml Calciveyxol 38/50 testsúlykilogramm intravénásan

Kiegészítő terápiaként allergiák, csalánkiütés, vérzéses diathesis és méhatónia esetén:

15-20 ml Calciveyxol 38/50 testsúlykilogramm intravénásan

Juh, borjú, sertés:

3-4 ml Calciveyxol 38/10 testsúlykilogramm intravénásan

Az intravénás infúziót lassan, 20-30 perc alatt kell beadni. A dózisok szabványos értékek, amelyek illeszkednek a hiány mértékéhez és az érrendszer adott állapotához. A kezelést először legkorábban 6óra elteltével szabad megismételni. További ismételt kezelés 24órás időközzel adható, ha bizonyított, hogy a fennálló tünetek továbbra is fennálló hypocalcaemiás köulményekkel függenek össze.

9.ÉLELMEZÉS EGÉSZSÉGÜGY VÁRAKOZÁSI IDŐ

Szarvasmarha, juh:

Ehető szövetek: 0nap

Tej: 0nap

Sertés:

Ehető szövetek: 0nap

10.KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Legfeljebb 25°C-on tárolandó. Fagyástól óvni kell. Csak a csomagoláson eltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

11.KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK

Az intravénás infundálást lassan kell végezni. Az infúzió során folyamatosan ellenőrizni kell a szív működést és a vérkeringést. Túladagolásra utaló tünetek (elsősorban szívritmuszavarok, vérnyomásesés, izgatottság) jelentkezésekor az infúziót azonnal le kell állítani.

Az általános munkavédelmi óvrendszabályokat be kell tartani.