

SunLitan® Gél/Veyxat

Állatgyógyászati gyógyhatású készítmény

- A készítmény háziállatok esetében az ízületek, inak, izomsérülések, rándulások okozta megbetegedéseinek, továbbá a panaritium kiegészítő kezelésére szolgál.
- A helyi vérellátás javulása elősegíti a patológiás tőgyödema csökkenését, masztitisz esetén a készítmény az antibiotikum tartalmú tőgyinfúziók melletti kiegészítő kezelésként a gyógyulást gyorsítja.



SunLitan Gél/Veyxat

Állatgyógyászati gyógyhatású készítmény



A készítmény összetétele

Hatóanyagok:

- Tisztított víz: 75-100 %
- Kámfor: 1-5%
- Metil-szalicilát: 0,5-2 %
- Petrolatum: 0,5-2%
- Izopropli alkohol: 0,5-2%
- Poliakril sav: 0,1-0,75%
- Nátrium-hidroxid: 0,1-0,4%
- Sárga kinolin:<0,1%
- Patentkék V:<0,1%

Javallat

A SunLitan Gél/Veyxat kámfor tartalmánál fogva vérbőséget okozó gyógyhatású készítmény, ugyanakkor metil-szalicilát tartalmánál fogva támogatja a gyulladáscsökkentő folyamatokat. A készítmény háziállatok esetében az ízületek, inak, izomsérülések, rándulások okozta megbetegedéseinek, továbbá a panaritium kiegészítő kezelésre szolgál. A helyi vérellátás javulása elősegíti patológiás tőgyödema csökkenését, masztitisz esetén a készítmény az antibiotikum tartalmú tőgyinfúziók melletti kiegészítő kezeléseként a gyógyulást gyorsítja.

Termékismertető

és címke 100ml, 150ml 450 ml, 1000ml-es flakonokra

1.A készítmény neve
SunLitan Gél/Veyxat
Állatgyógyászati gyógyhatású készítmény

2.Termékforma
Külsőleges gél

3.A készítmény összetétele
1 g gél tartalmaz:
Kámfor: 50mg
Metil-szalicilát

4.Célállatfajok
Ló, szarvasmarha, juh, kecske, sertés, kutya, macska

5.A készítmény felhasználási területe, felhasználási javaslat, javallatok
A SunLitan Gél/Veyxat kámfor tartalmánál fogva vérbőséget okozó gyógyhatású készítmény, ugyanakkor metil-szalicilát tartalmánál fogva támogatja a gyulladáscsökkentő folyamatokat. A készítmény háziállatok esetében az ízületek, inak, izomsérülések, rándulások okozta megbetegedéseinek, továbbá a panaritium kiegészítő kezelésére szolgál. A helyi vérellátás javulása elősegíti a patológiás tőgyödema csökkenését, masztitisz esetén a készítmény az antibiotikum tartalmú tőgyinfúziók melletti kiegészítő kezeléseként a gyógyulást gyorsítja.

6.Adagolás és alkalmazás módja
Megfelelő mennyiségű készítménnyel naponta 1-3 alkalommal finoman dörzsöljük be a kezelni kívánt területet.

7.Ellenjavallatok
Sebes bőrfelületen illetve nyálkahártyákon nem alkalmazható.

8.Mellékhatások
Nem ismeretesek.

9.Figyelmeztetések
A készítmény csak előírás szerint alkalmazható.

10.Lejáratási idő
Felhasználható eredeti csomagolásban tárolva a gyártástól számított 3 évig.

11.Tárolási előírások
Szobahőmérsékleten, 25° C alatt, száraz helyen, fénytől védve tartandó.

12.Csomagolás

100ml

150ml

450m

1000ml